

ALSACE APPRO


Société Coopérative Agricole


VOUS conseille


Enervin®

L'INNOVATION ANTI-MILDIU

*La barrière ciro-dynamique
pour résister
aux intempéries*

 **A base
d'amétoctadine...
une nouvelle famille
chimique.**

 **Longue préventivité :
12 à 14 jours.**

 **Résistance au lessivage
remarquable.**

 **La barrière ciro-dynamique
contre le mildiou.**

 **Pratique : granulés
dispersables.**

NOS PRÉCONISATIONS

Mildiou : 2,5 kg/ha

- en préventif
- en association

**Nombre d'applications
possibles par saison : 2**
(Qil inclus).

LA RÉGLEMENTATION

DRE : 6 heures

DAR : 35 jours

ZNT : 5 mètres

**Mélange possible
avec la plupart
des anti-oïdium**

SAINT-HIPPOLYTE

5 rue de Rodern
Tél : 03 89 73 00 98

SIGOLSHEIM

24 rue du Stade
Tél : 03 89 47 15 73

PFAFFENHEIM

3 rue de Turenne
Tél : 03 89 49 60 90

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

ALSACE APPRO

Société Coopérative Agricole

VOUS conseille

Enervin®

L'INNOVATION ANTI-MILDIYOU

**1 BIDON
pour
2 HECTARES**



LA CARTE D'IDENTITÉ

Autorisation de vente n° 2100221.

Composition : 120 g/kg amétoctradine + 440 g/kg métirame.

Formulation : granulés dispersibles (WG).

Classement toxicologique :

N : dangereux pour l'environnement.

R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conditionnement : 1 bidon pour 2 ha (5 kg).

Usage et doses autorisés : vigne, mildiou : 2,5 kg/ha.

Nombre maximum d'applications par an : 2.

Délai d'emploi avant récolte : 35 jours.

Distance aux points d'eau : 5 mètres.

Délai de rentrée : 6 heures.

Protection de l'utilisateur : Phases de préparation, chargement de la bouillie et application en l'absence de cabine : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité et masque de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, combinaison de protection de type 4.

Autres conditions d'emploi : pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Ne pas stocker la préparation à une température > 40°C.

Utiliser la préparation en préventif uniquement.

Alternier l'utilisation de la préparation avec celle d'autres fongicides ayant un mode d'action différent et appartenant à d'autres groupes de résistance afin d'éviter le risque de résistance croisée.

Utiliser la préparation en préventif uniquement.

© Marque déposée BASF - Avril 2011 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du n° Azur BASF Agro (0.810.023.033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Dangereux. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation du produit, s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.